ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C ___ R. 44

N° ~~13~~6. 1

Observation sur la ~~superfœtation~~, par
Durrieux desparros ~~fthisu~~ maitre ès arts, chirurgien major
du regiment de cavalerie de la rochefoucauld.
a charleville ce 1er novembre 1744

Les connoissances se multiplient, les sciences se perfectionnent,
Et la nature offre toujours une vaste carrière a nos recherches:
L'opération par la quelle l'Espèce se reproduit, Est sans doute la
plus Essentielle, Et fut longtems la plus obscure.
occupés de tout ce qui pouvoit y jetter de la clarté, les scavants
s'Empresserent à l'Envi de publier leurs idées; harvei créa
le sisteme du point vivant, ⊖ premier principe de l'animal,
qui se forme Ensuite par dégrés: graaf soutint celuy des œufs, ⊕
L'ami après democrite, hipocrate, Epicure, prétendit, que le
fœtus etoit formé, par le melange des deux semences; ✱
hartsoiker, Et levenöek decouvrirent les animalcules.
tous ces sistemes, loin de donner plus de lumière, sur la génération,
y repandoient des ténèbres plus Epaisses: Enfin après plusieurs
Expériences, l'on a démontré ⊗ que l'œuf fécondé dans l'ovaire,
etoit l'unique moyen, qu'Employe la nature pour nous faire
revivre.

⊖ punctum saliens, harvei, de cervarum, Et damarum coitu
⊕ regneres de graaf de mulierum organis p. 196.
✱ discours anatomiques de mr. l'ami p. 196
⊗ mémoires de l'académie royale des sciences année 1701 p. 109 observ. par m. litre.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 50 n° 101

mais cet oeuf une fois fécondé, peut-il etre suivi de plusieurs autres,
en differens tems ? la matrice occupée pendant la grossesse, a
l'accroissement du fetus qui luy a eté confié, est-elle susceptible
d'assés de dilatation pour la formation d'un autre ?
On le croyoit anciennement, ✱ les autheurs modernes refutent cette
opinion fondés sur ce que l'on trouve entre les rides du petit col
de la matrice, les orifices de plusieurs petits conduits, d'ou suinte
une liqueur gelatineuse, qui scelle l'orifice de la matrice,
tout le tems que dure la grosesse ⊕
mais la nature capricieuse, met souvent en défaut tous les
raisonnemens phisiques ; il est arrivé de nos jours, des accouchemens
de plusieurs enfans ; hermentrude, femme du comte isemberg
d'altort, eut douze enfans d'une seule couche ⊙. jean françois pic
rapporte qu'une allemande nommée dorothée, fit vingt enfans,
en deux couches, et qu'une autre en eut trente en quatre couches. ⊚.
cælius rodhiginus, dit aprés albert le grand, qu'une femme avorta,
de vingt deux enfans.
quoyqu'il soit vraisemblable, que les enfans formés en differens tems,
n'ont vus le jour ensemble, que parceque la matrice, une fois dilatée,
les derniers sans etre a terme, ont suivis immediatement aprés l'expulsion,
du premier ; l'on peut cependant soutenir que cette quantité d'oeufs a eté
fecondée, dans le même instant, et sans m'attacher á prouver le contraire,
je passe a un exemple plus convaincant.

✱ traité théorique pratique des accouchements de mr. smelie docteur anglois traduit par mr. de préville section vi de la superfetation
⊕ dictio. universel de medecine v. 4 p. 92
⊙ cromerius de origine, et rebus gestis polonorum liber. 11:
⊚ observationes joannis f. pic apud licosthenem p. 644.

mr. verret chirurgien gagnant maitrise a l'hopital general de paris,
accoucha une fille au terme ordinaire l'an 1789: quelques jours aprés,
l'accouchée sentit remuer un autre Enfant, Et au bout de trois mois,
le mit au monde plein de vie.

dira-t-on que le premier est né par accident avant son terme, Et
qu'Ensuite l'orifice interne de la matrice s'Est resserré, au point
de retenir l'autre, jusqu'a ce qu'il y soit parvenu. le faux d'une
pareille idée, Est démontré par le fait luy même.

mais la nouveauté des faits leur donne souvent plus de poids;
a ce titre j'Espere que l'on se rendra a ce qui arrive aujourdhuy
vintcinq octobre a mezieres.

madame bourgeois femme d'un Entrepreneur, agée de trente ans,
Et Enceinte de cinq mois, a ressentie cette nuit des douleurs avec
perte, Et pour la septieme fausse couche a mise au monde, Entre
les mains de madame le chet sage femme de charleville, un garçon
qui n'a vécu que quelques minutes.

trois heures Etoient a peine Ecoulées, lorsque la garde restée seule
avec l'accouchée a ramassée dans son lit un corps Etranger, dont Elle
venoit d'Etre délivrée, sans secours Et presque sans douleur; Et l'ayant
Enveloppé dans un linge l'a donné le matin á ~~md~~ le chet, Et au
medecin de la maison pour l'Examiner; ils ont vus avec surprise, un
placenta de la grosseur d'un œuf, Et ayant suivis le cordon
ombilical jusqu'aux membranes, qui Etoient pleines d'Eau

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ils ont découverts un fœtus, long de sept a huit lignes, bien formé, Et les levres surtout Extremement vermeilles. ✠

la distance considerable du dernier né, d'avec le premier qui avoit six pouces de longueur, Et gros a proportion, Est plus que suffisante pour prouver la superfœtation.

dira-t-on Encore que le fait sçu de tout mezieres, Et charleville, n'Est pas une preuve de conviction; pourra-t-on objecter! que les deux Enfans conçus En même tems, n'ont pas Eu une nourriture Egale, Et par Conséquent devoient differer en volume: une pareille Conséquence seroit deduite d'un principe Evidemment faux; qui ne sçait? qu'un fœtus qui ne reçoit pas assés de nourriture se desseche, Et se pétrifie, Et qu'au Contraire il tombe En dissolution où En pourriture, lorsque quelque autre accident luy cause la mort.

mais j'Entends de nouvelles objections, cet Enfant, dira quelqu'un avec assés de nourriture pour subsister n'En avoit pas pour l'accroissement, d'ailleurs, le fœtus pouvoit etre privé de vie, Et se conserver dans la liqueur, que renferme le chorion, Et l'amnios.

✠ il Est chés mr. pierre medecin de mezieres, qui s'En Empara aussitôt pour le mettre dans l'Esprit de vin où il a un peu diminué.

a cela je réponds: il Est dans l'ordre de la nature, que
l'Embrion croisse En se nourrissant, Or si celui-cy formé au
même instant que le premier né a pu subsister, il Est moralement
impossible qu'il n'ait pas Eté susceptible de plus d'accroissement
pour peu qu'il ait receu de nourriture, où s'il En a eté Entiérement
privé, il devoit Etre desseché, Et les membranes vuides d'Eau
le fœtus peut il Est vrai Etre conservé quelque tems dans la liqueur,
où il nage; mais cette liqueur, manquant d'entretien, parceque
la circulation de la mere a l'Enfant Est supprimée par la mort
de ce dernier, Elle doit Etre absorbée au bout d'un certain tems,
Et occasionner le dessechement du fœtus, Et des membranes qui le
contenoient, ainsi qu'on l'a remarqué plusieurs fois.
je dis plus, il Est hors de toute vraisemblance, qu'un Embrion, gros
Exactement, comme il doit l'Etre a trois semaines, ou un mois,
a quelque petit degré de nourriture qu'on le suppose, ait Eté formé
au même instant, que celuy qu'on reconnoît agé de cinq mois.
il y a aussi tout lieu de croire que si l'on avoit ouvert les membranes
sur le champ, l'on auroit apperçu dans l'Embrion des signes de vie:
cette conjecture devient certitude, par la couleur vermeille de
ses levres, Et le bon Etat, où On le trouva le lendemain.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

malgré des preuves aussi convaincantes, je ne pretends point
donner une régle générale, exacte a reciter un fait que je regarde
avec tout le monde comme un phenomene, je soutiens la
superfœtation possible, seulement lorsque la matrice sera
plus dilatée que dans son Etat naturel, et assurément la
molesse des fibres de la matrice, Est assés Etayée, aprés une septiéme
fausse couche sans autre accident, joint á ce que madame bourgeois,
mariée dés l'age de seize ans, a fait avant ses fausses couches neuf
enfans tous prématurés, c'Est á dire de sept a huit mois: quelques uns sont
vivans.

par supplement —

dans l'instant que je finis cette observation, l'on m'apprend que mde bourgeois
vient Encore d'accoucher d'une môle, dont l'Expulsion a Eté precedée,
par des douleurs violentes, Et une perte assés considérable.
la mole longue d'Environ trois pouces Et demi, Est de la figure d'une
bouteille large de ventre, Et le col mince Et quarré.
Elle paroit de l'avis commun antérieure au premier fœtus, quoyqu'Elle
ait restée huit jours aprés, Et cette idée, Est d'autant mieux fondée,
que c'Est un corps charnu noiratre, Et trés dur.
On decouvre a une des faces laterales, les orifices de plusieurs vaisseaux
qui prouvent son adhérence á la matrice, dont Elle tiroit sa
nourriture, Et qui auroit vraisemblablement contribuée á l'augmenter,
si l'Ebranlement causé par l'accouchement n'avoit aidé á son Expulsion.